

S T E L T L O P E R S

aan de bovenloop

van de

P O P P E L S C H E L E Y .

1 9 7 7

-----  
V O G E L W E R K G R O E P F A L C O O I S T E R W I J K  
-----

## STELTLOPERS AAN DE BOVENLOOP VAN DE 'POPPELSCHÉ LEY'.

-----

De bovenloop van de Poppelsche Ley wordt tussen de landgoederen 'De Kievit' (gem. Baarle-Nassau, Nederland) en 'De Schrieken' (gemeente Poppel, België) gevormd door een drietal waterloopjes, n.l. de Rethsche Loop, de Ossevenneloop en een watertje, waarvan ons geen naam bekend is. Deze beekjes hebben zich hier en daar tamelijk diep ingesneden, waardoor op die plaatsen een aantrekkelijk glooiend landschap is ontstaan. In de laagste delen van dit gebied heeft zich een opmerkelijk rijke steltloperpopulatie gevestigd.

Op 26 juli 1977 brachtten J. Swaans en L. Hilgers een bezoek aan dit gebied. Afgezien van het feit, dat één bezoek aan een bepaald terrein onvoldoende is om een betrouwbaar beeld van de broedvogelbevolking te krijgen, was deze datum eigenlijk ook te laat in het seizoen. Waarschijnlijk tengevolge van het slechte weer, waardoor vroege legsels verloren kunnen zijn gegaan, werden in het terrein toch nog paren met nog niet vliegvlugge jongen waargenomen.

Genoteerd werden: alarmerende vogels/paren en vogels/paren met nog niet vliegvlugge jongen. Het gebied waarin werd geteld werd in het noorden begrensd door de weg Veldbraak - De Schrieken, in het zuiden door de belgische grens en in het westen bij benadering door het zandpad dat van het gehucht Veldbraak leidt naar de belgische grens. De oppervlakte bedraagt naar schatting 100 ha. Opgemerkt dient te worden, dat ook op belgisch grondgebied Wulpen Grutto's werden waargenomen; deze zijn in onderstaande tabel niet meegeteld.

### Resultaten:

Wulp	15 paren.
Grutto	8 paren.
Scholekster	2 paren.
Kievit	(niet geteld; naar schatting 15 - 20 paren)

Uiteraard dienen deze gegevens met de nodige terughoudendheid gehanteerd te worden. Gezien het schaarse voorkomen van met name de Wulp, zeker op kultuurgronden, is deze populatie een nader onderzoek in een komend broedseizoen zeker waard.

In het beschreven gebied werden op 26 juli bovendien nog de volgende soorten waargenomen:

Ringmus, Koolmees, Geelgors, Vink, Matkop (met pas uitgevlogen jongen), Ekster, Torenvalk, Koekoek, Veldleeuwerik, Tortelduif, Witte Kwikstaart (met jongen), Merel, Winterkoning, Patrijs, Houtduif (broedend), Grote Bonte Specht, Grasmus, Kneu (met jongen), Bosrietzanger

-----